

Міністерство охорони здоров'я України
Національний інститут раку МОЗ України
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

науково-практична конференція

**Променеві методи дослідження
як діагностичний та лікувальний супровід
в онкології**

5–6 квітня

Київ — 2012

УДК 615.849.1 + 616–006 + 616–07

Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження

як діагностичний та лікувальний супровід в онкології»

Київ: 2012, 172 с.

Збірник містить нові результати з променевих методів дослідження в онкології. Розглянуто різноманітні сучасні діагностичні та лікувальні методики, які ґрунтуються на застосуваннях ЧЗД, КТ, ПЕТ-КТ, МРТ та інші.

Викладений матеріал буде корисним фахівцям з проблем діагностики та терапії в онкології, лікарям променевої діагностики.

Зміст

Abdullaev R.Ya., Tamm T.I., Hyzhniak A.A., Golovko T.S.	
Ultrasoundography of paravertebral space for paravertebral block conduction	8
Абдуллаев Р.Я., Тамм Т.И., Гижниак А.А., Головко Т.С.	
Дооперационная ультразвуковая диагностика рака желудка	10
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Горлеку Ф.	
Особливості ультразвукової діагностики гепатоцелюлярного раку печінки	13
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Кріжановська І.В., Сисун Л.А.	
Ультрасонографічна семіотіка метастазів печінки	16
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Єфіменко С.Г.	
Ультразвукова дифференційна діагностика доброкісних пухлин печінки	19
Абдуллаев Р.Я., Пономаренко С.А., Горлеку Ф., Кріжановська І.В.	
Можливості ультрасонографії та КТ в діагностіці гепатоцелюлярного раку	21
Бабий Я.С., Сычева Т.В.	
Эффективный выбор радиологических методов исследования при раке легкого	24
Бакай О.О.	
Можливості еластографії в ультразвуковій діагностиці новоутворень різної локалізації	28
Батюк С.І., Бриндіков Л.М., Табола М.М., Попович В.В.	
Ультразвукове дослідження метастазів в лімfovузли при ракові прямої кишки	30
Білоненко Г.А., Шкарбун Л.І., Аксюнова О.Г., Аксюнов О.А.	
Рак чи мастиг? Сучасний діагностично-лікувальний супровід при запальніх змінах грудей	32
Bubnov R.V.	
Unremovable idiopathic pain treatment by novel ultrasound guided technique	37

Bubnov R.V., Boyko V.V.	
The capabilities of ultrasonography in complex diagnostics of advanced colorectal cancer. A prospective study	39
Бубнов Р.В., Строкань А.М., Абдуллаев Р.Я.	
Принципи навчання використання сонографії в регіональній анестезії та медицині болю	41
Бубнов Р.В.	
Персоналізована, прогностична та профілактична медицина (ПППМ). Сучасна європейська парадигма	48
Бубнов Р.В., Мухомор О.І.	
Інвазивна сонографія легеневої тканини та органів грудної клітки	52
Бубнов Р.В., Мельник І.М.	
Оптимізація медичних рішень та визначення помилки інтервенційної сонографії за допомогою математичних моделей.	56
Верба А.В., Гуменюк К.В., Коваль І.М.	
Досвід виконання черезшкірно-черезпечінкового дренування жовчних шляхів у хворих із захворюваннями гепато-панкреатодуоденальної зони, що ускладненні механічною жовтяницею	66
Волоткович А.Ю., Мачнєва О.В.	
Променеві методи дослідження у комплексній діагностиці раку молочної залози	70
Головко Т.С., Крахмалева Л.П., Склляр С.Ю.	
Роль лучевой диагностики при непальпируемых опухолях молочной железы	72
Головко Т.С., Крахмалева А.С.	
Комплексная диагностика узловых образований грудных желез	74
Grabovetskyi S.A.	
Multivoxel MR spectroscopy in the differential diagnosis of brain tumors. Predictive and personalized approach	77
Гречаник О.І., Абдуллаев Р.Я., Красильников Р.Г., Цвігун Г.В.	
Комплексна ультразвукова діагностика ураження внутрішніх органів у онкопротологічних хворих	79
Грищенко О.В., Бобрицкая В.В., Васильева И.А.	
Сонографический контроль динамических изменений ткани молочной железы в процессе патогенетической терапии	81

Гуралевич Ю.В., Головко Т.С., Цып Н.П.	
Возможности ультразвукового исследования в диагностике узловой и неузловой форм трофобластической болезни	86
Дерев'янко Л.П., Талько В.В., Атаманюк Н.П., Яніна А.М., Родіонова Н.К.	
Оцінка функціонального стану гіпофізарно-гонадної системи у жінок репродуктивного віку після променевої терапії пухлин головного мозку	88
Дикан І.М., Козаренко Т.М., Логаніхіна К.Ю.	
Можливості агіографічного дослідження мультидетекторної комп’ютерної томографії в оцінці ефективності хіміопроменевої терапії у хворих на рак горла	93
Добровольский Н.А. Иванова Л.П. Тавартиладзе Н.Е. Богданович Л.И. Куличкова О.В.	
Остеосцинтиграфия с Tc99m как один из методов ранней диагностики метастазов в кости скелета	97
Іванкова В.С., Шевченко Г.М., Хруленко Т.В., Барановська Л.М., Скоморохова Т.В., Отрощенко І.П., Галляс О.В.	
Сучасні технології високоенергетичної HDR брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки	101
Каратунова Е.Н., Ясиницкая Н.А.	
Иновационный метод ультразвуковой абляции опухолей человека	103
Клюсов О.М., Войтко О.В., Говоруха Т.М., Лола О.І., Олійніченко О.Г., Холодна А.В.	
Перший досвід центру ядерної медицини київського міського клінічного онкологічного центру застосування поєднаного ПЕТ-КТ у онкохворих	105
Кравченко Д.А., Логанихина Е.Ю.	
Определение объема резекции гортани при раке ее срединного отдела (T2-3N0M0)	108
Красильников Р.Г.	
Визначення особливостей МРТ-симіотики головного мозку в залежності від синдромологічної картини у віддалений період легкої закритої черепно-мозкової травми	110

Лаврик Г.В.	
Стандарты лучевой диагностики в стадировании рака печени	116
Лущик Ч.Б., Новицкий В.В., Рябець Л.С., Коломійчук О.П., Приз А.М.	
Можливості сучасних методів досліджень та інформаційних технологій в ранній доклінічній діагностиці перебудов судинного русла при онкопатології	119
Максимовский В.Е., Добровольский Н.А., Четвериков С.Г., Лурин А.Г., Машуков А.А.	
Неинвазивный контроль роста опухолевых очагов после радиочастотной термоабляции	127
Mukhomor O.I., Bubnov R.V.	
Prediction outcome of aspiration treatment under ultrasound guidance using sonoelastography (personalized and predictive management in gynaecology)	131
Mukhomor O.I., Bubnov R.V., Abdullaev R.Ya.	
Sonoelastography enhanced US guided biopsy for prostate cancer detection	133
Педаченко Ю.Е.	
Пункционная вертебропластика в хирургическом лечении метастатических поражений позвоночника	136
Погодаева Г.А., Казакевич В.Г.	
Роль профилактических ЧЗ-осмотров в ранней диагностике рака простатальной железы	138
Процык Е.Е., Головко Т.С.	
Возможности ультразвуковой диагностики опухолей слюнных желез ..	141
Рошупкін А.О., Горобинська С.М.	
Аналіз безпеки застосування контрастних засобів при проведенні МРТ	144
Смакова М.С., Коровина А.С.	
Лучевая диагностика костных проявлений при множественной миеломе	146
Смоланка И.И., Іванкова В.С., Склар С.Ю., Іванкова О.М.	
Використання радіомодифікаторів при комплексному лікуванні хворих на резистентні форми раку грудної залози	148

*Смоланка І.І., Солодяннікова О.І., Скляр С.Ю.,
Костриба О.І.*

Променева діагностика в оцінці стану та розташування регіонарних та «сторожових» лімфатичних вузлів при виборі обсягу операції у хворих на рак грудної залози 150

*Щепотін І.Б., Шептицький В.В., Приймак В.В.,
Колесник О.О., Лукашенко А.В.*

Черезшкірне череззпечінкове дренування жовчних протоків у онкологічних хворих, з механічною жовтяницею, під контролем ЧЗ 152

*Щепотін І.Б., Шептицький В.В., Приймак В.В.,
Колесник О.О., Свінницький В.С., Лукашенко А.В.*

Малоінвазивні втручання під контролем ЧЗ, в лікуванні післяопераційних ускладнень у хворих з онкопатологією органів черевної порожнини, за очеревинного простору та органів малого тазу 153

*Тюєва Н.В., Добровольський М.А., Таварtkіладзе Н.Є.,
Дідорчук С.П., Сафронова О.В.*

Можливості ЧЗД в моніторингу регресії пухлин шийки матки протягом поєднаної променової терапії 155

Францевич К.А.

Комплексна променева діагностика дифузних мастопатій 158

Халилеев А.А., Головко Т.С., Лаврик Г.В., Рудая Л.В.

Аналіз воротного кровотока у пацієнтів з злоякісними новообразуваннями брюшної полости 162

Хурані І.Ф., Какаркін О.Я., Григоренко С.В.

Роль спіральної комп'ютерної томографії у виявленні постхіміо-променевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози 164

Чернобай Т.Н.

Лучевая диагностика рака пищевода 169

Гуралевич Ю.В., Головко Т.С., Цып Н.П.

*Национальный институт рака, отдел лучевой диагностики
Киев, 03022, ул. Ломоносова, 33/43,
тел. +38 (044) 257-40-49, (067) 503-51-37, gura77uv@gmail.com*

Возможности ультразвукового исследования в диагностике узловой и неузловой форм трофобластической болезни

Трофобластическая болезнь (ТБ) варьирует от 1 случая на 1500–2000 беременностей в Центральной Европе и США и до 1 на 150 беременностей в Азии и остается важной диагностической проблемой исходя из сложности постановки диагноза в максимально возможные ранние сроки заболевания. Цель. Изучить возможности ультразвукового исследования ТБ и оценить результаты лечения патологии в отдаленном периоде.

Материалы и методы. В период 2010–2012 гг. в отделении ЧЗ диагностики отдела лучевой диагностики национального института рака проходили обследование 351 пациентка с ТБ. Возраст составил от 17 до 44 лет, в среднем $31 \pm 2,4$ года. Осмотр проводился на аппарате SONOScape SSI-1000 датчиками 6–2 МГц (трансабдоминальный) и 9–5 МГц (трансвагинальный секторный). Больные были поделены на 2 группы: группа узловой формы ТБ (УФ) — 28 (7,97%) пациентов и группа безузловой формы (БФ) — 323 (92,02%) больных. По локализации узлы определялись в полости и в миометрии, по структуре: солидные и кистозно–солидные, по васкуляризации — с перинодулярным, смешанным (хаотичным) кровотоком и аваскулярные. Скрининг проводился 1 раз в 30 дней на протяжении 11 месяцев.

Результаты. У больных группы УФ по локализации узлы выявлялись: в полости — 9 (32%) больных и в миометрии — 19 (68%) пациентов. Средние размеры узлов в полости составляли от 20 до 40 мм, в среднем $28 \pm 2,3$ мм

© Гуралевич Ю.В., Головко Т.С., Цып Н.П., 2012

с преобладанием солидно-кистозного типа — 5 (55%); при цветном допплеровском картировании (ЦДК) узлы имели: смешанный тип кровотока — 4 (45%), аваскуляризированный тип — 2 (22,5%), у 3 (33,3%) — перинодулярный тип. У 3 (10,7%) больных в течение 1,5 месяцев произошло рождение узла и в последующем периоде они перешли в группу БФ. В миометрии средние размеры узлов составляли от 10 до 60 мм, в среднем $34 \pm 5,2$ мм с преобладанием солидного типа — 13 (68,4%); по локализации: в области дна — у 5 (26,3%) больных, в области шейки — у 3 (15,8%), по задней поверхности — 8 (42,1%), по передней поверхности — 4 (21%); при ЦДК преобладал перинодулярный тип кровотока — 10 (52,6%), смешанный тип — 5 (26,3%), аваскуляризированный тип — 4 (21%). В группе БФ на протяжение 2 месяцев у 2 (0,62%) пациенток определились вновь выявленные узлы после первичного ЧЗ осмотра.

Выводы.

1. ЧЗ исследование остается основным скрининговым методом в диагностике ТБ.
2. В структуре больных с ТБ преобладают безузловые формы заболевания.
3. Преимущественно узлы локализовались в миометрии, солидной структуры с перинодулярным типом кровотока.
4. В полости преобладали узлы солидно-кистозной структуры со смешанным типом кровотока.
5. В течении 1,5 месяцев возможен переход из одной формы ТБ в другую.

Ключевые слова: трофобластическая болезнь, ультразвуковое исследование, узловая форма, безузловая форма.